

PROVA PARA ACESSO DIRETO

GABARITO PRELIMINAR – QUESTÕES OBJETIVAS – 1 a 45

Questões	Alternativa Correta
1	B
2	B
3	D
4	A
5	C
6	D
7	A
8	B(*)
9	A
10	C
11	A
12	D
13	A
14	D
15	B

Questões	Alternativa Correta
16	B
17	D
18	C
19	A
20	C
21	D
22	B
23	A
24	C
25	B
26	C
27	B
28	D
29	A
30	C

Questões	Alternativa Correta
31	A
32	B
33	D
34	C
35	D
36	C
37	B
38	A
39	C
40	D
41	A
42	D
43	B
44	A
45	C

(*) – Retificação do Gabarito.

PADRÃO DE RESPOSTAS PRELIMINAR – QUESTÕES OBJETIVAS DE RESPOSTA CURTA

SERÃO CONSIDERADOS NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS DE RESPOSTA CURTA TERMOS SINÔNIMOS, EQUIVALENTES OU CORRELATOS QUE MANTENHAM O NÍVEL DE PRECISÃO REQUERIDO NA RESPOSTA.

➤ **Situação Problema – Questões de 46 a 48**

46) PADRÃO DE RESPOSTA:

Polissonografia noturna completa em laboratório (PSG tipo I).

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Polissonografia.
- Polissonografia noturna (laboratorial).
- Polissonografia de noite inteira.
- Monitorização multiparamétrica do sono (OU durante o sono).

47) PADRÃO DE RESPOSTA:

Ausência da Redução fisiológica da Pressão Arterial de 10 a 20% durante o sono.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Ausência de descenso da pressão arterial no sono.
- Ausência de descenso noturno.
- Ascensão da pressão arterial durante o sono.
- Padrão não-dipper.
- Padrão “reverse dipper”.
- Queda noturna de PA < 10 %.

48) PADRÃO DE RESPOSTA:

Uso de dispositivo não invasivo que fornece pressão respiratória positiva contínua nas vias aéreas CPAP ("Continuous Positive Airways Pressure".)

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- CPAP.
- Terapia com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP).
- Iniciar CPAP noturno.
- Iniciar terapia não invasiva de pressão respiratória positiva contínua durante o sono.

➤ **Situação Problema – Questões de 49 a 51**

49) PADRÃO DE RESPOSTA:

Abstinência alcoólica.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Abstinência de álcool.
- Suspender totalmente o consumo de bebidas alcoólica.
- Cessar o uso de álcool.
- Parar de beber.
- Parar de beber álcool.

50) PADRÃO DE RESPOSTA:

Pré-contemplação.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Estágio de pré-contemplação.
- Fase de pré-contemplação.

51) PADRÃO DE RESPOSTAS:

Elastografia hepática.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Fibroscan.
- Elastografia.
- Elastografia transitória.
- Elastografia hepática por ultrassom (transitória).
- Elastografia por RM.
- FIB 4.

➤ **Situação Problema – Questões de 52 a 54**

52) PADRÃO DE RESPOSTA:

Estabilidade hemodinâmica sustentada, sem necessidade de vasopressor.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Paciente hemodinamicamente estável.
- Estabilidade hemodinâmica sustentada.
- Estabilidade hemodinâmica mantida após reposição volêmica.
- Estabilidade hemodinâmica sem uso de drogas vasoativas.
- Estabilidade hemodinâmica sustentada sem vasopressor.
- Hemodinâmica estável após ressuscitação inicial.
- Níveis pressóricos estáveis sem uso de vasopressor.

53) PADRÃO DE RESPOSTA:

Realizar Laparotomia exploradora emergencial.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Laparotomia exploratória de emergência.
- Laparotomia exploradora.
- Laparotomia com controle de danos.
- Laparotomia com tamponamento hepático (packing).
- Laparotomia com packing hepático.

54) PADRÃO DE RESPOSTAS:

A combinação de dois dos seguintes:

- Bilioma.
- Fístula biliar.
- Hemorragia tardia.

➤ **Situação Problema – Questões de 55 a 57**

55) PADRÃO DE RESPOSTA:

Hérnia inguinal direita complicada com estrangulamento.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Hérnia inguinal direita estrangulada.
- Hérnia estrangulada.
- Estrangulamento de hérnia inguinal.
- Hérnia inguinal direita estrangulada com obstrução intestinal.
- Hérnia inguinal direita estrangulada com sofrimento de alça.

56) PADRÃO DE RESPOSTA:

Sinais de peritonite difusa e abdome agudo inflamatório grave.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Sinais de Peritonite difusa.
- Sinais de peritonite generalizada.
- Abdome em tábua.
- Rigidez abdominal difusa.
- Defesa abdominal difusa.
- Dor abdominal difusa com descompressão brusca positiva.
- Sinais de irritação peritoneal difusa.
- Sinal de Blumberg .
- Choque séptico.

57) PADRÃO DE RESPOSTA:

Laparotomia exploradora de urgência para abordagem da hérnia inguinal estrangulada.

(*)RESPOSTAS ACEITÁVEIS: Retificação no Padrão de Respostas.

- Laparotomia exploradora.
- Laparotomia de emergência.
- Laparotomia exploradora de emergência.
- Laparotomia mediana para exploração da cavidade abdominal.
- Laparotomia para exploração de vísceras e tratamento da hérnia estrangulada.

➤ **Situação Problema – Questões de 58 a 60**

58) PADRÃO DE RESPOSTA:

Síndrome dos ovários policísticos (SOP).

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Síndrome de Anovulação crônica.
- Síndrome de Stein-Leventhal.
- SOP segundo os critérios de Rotterdam.
- SOP com hiperandrogenismo clínico/laboratorial e morfologia policística.
- Distúrbio ovulatório por Síndrome dos Ovários Policísticos.
- Anovulação crônica associada à SOP.

59) PADRÃO DE RESPOSTA:

Os três critérios de Rotterdam: Oligo/anovulação crônica E Hiperandrogenismo clínico e laboratorial E Ovários policísticos ao ultrassom – volume ≥ 12 mL e ≥ 20 folículos periféricos.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS

1. Oligo/anovulação

- Oligo-ovulação.
- Anovulação crônica.
- Espaniomenorreia.
- Ciclos infrequentes ou irregulares (40–60 dias).

2. Hiperandrogenismo clínico e/ou laboratorial

- Hiperandrogenismo clínico.
- Hiperandrogenismo laboratorial.
- Excesso de hormônios masculinos.
- Testosterona elevada.
- Sinais clínicos de hiperandrogenismo (acne, hirsutismo, oleosidade, alopecia).

3. Ovários policísticos ao ultrassom

- ≥ 20 folículos periféricos no ovário.
- ≥ 20 folículos entre 2–9 mm.
- Volume ovariano $\geq 10 \text{ cm}^3$.
- AMH elevado / Hormônio Anti-Mulleriano elevado

60) PADRÃO DE RESPOSTA:

Mudança do estilo de vida com perda de peso.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Iniciar intervenção no estilo de vida com perda ponderal (dieta equilibrada e atividade física regular).
- Orientar dieta e exercício.
- Redução ponderal com dieta e exercício físico.
- Intervenção no estilo de vida visando perda de peso.
- Perda de peso com dieta equilibrada e atividade física regular.
- Perda ponderal de 5–10% com dieta e exercício.
- Iniciar programa de perda de peso com reeducação alimentar e exercício regular.

➤ Situação Problema – Questões de 61 a 63

61) PADRÃO DE RESPOSTA:

Penicilina benzatina 2,4 mi UI IM, em dose única (1,2 milhões UI em cada nádega), após dessensibilização.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI IM, dose única.
- Penicilina benzatina 2,4 mi UI IM, dose única.
- Uma aplicação intramuscular de Penicilina benzatina 2,4 milhões de Unidades.
- Penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades, intramuscular, em dose única.

62) PADRÃO DE RESPOSTA:

Encaminhar para dessensibilização hospitalar à penicilina

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Dessensibilização em hospital e tratamento com penicilina.
- Dessensibilização à penicilina em ambiente hospitalar

63) PADRÃO DE RESPOSTA:

Rastrear e tratar parceiros sexuais.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Rastrear e tratar o parceiro sexual atual.
- Rastreamento sorológico e tratamento dos parceiros sexuais.
- Investigar e tratar parceiros.

➤ **Situação Problema – Questões de 64 a 66**

64) PADRÃO DE RESPOSTA:

Morbillivirus (vírus do sarampo)

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Vírus do sarampo.
- Paramyxovírus (vírus do sarampo).
- Paramyxovírus do sarampo.

65) PADRÃO DE RESPOSTA:

Isolamento respiratório por aerossóis até 4 dias após o início do exantema.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Isolamento respiratório por aerossóis por 4 dias após o início do exantema.
- Isolamento respiratório até 4 dias após o início do exantema.

66) PADRÃO DE RESPOSTA:

Notificação imediata E bloqueio vacinal dos contatos.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS. Pelo menos duas medidas, obrigatoriamente combinando as seguintes categorias:

1- Notificação:

- Notificação compulsória.
- Notificação em até 24 horas.
- Notificação ao Sistema de Vigilância (SINAN etc.).

2- Bloqueio vacinal

- Bloqueio vacinal dos contatos suscetíveis.
- Vacinação de bloqueio dos contatos próximos.
- Campanha de vacinação de bloqueio nas áreas com circulação.

3- Busca ativa

- Busca ativa de casos.
- Busca ativa de novos casos na comunidade / escola / creche.
- Rastreamento de outros casos suspeitos no domicílio/comunidade.

➤ **Situação Problema – Questões de 67 a 69**

67) PADRÃO DE RESPOSTA:

Não deve informar, pois não se trata de violência nem risco de vida, devendo ser preservado o sigilo.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Deve-se preservar o direito da adolescente e o sigilo médico.
- Não informar pois não se trata de violência.
- Não informar conforme a Manutenção do sigilo profissional (conforme o Código de Ética Médica).
- Não informar conforme o Direito da adolescente à confidencialidade e autonomia progressiva.

68) PADRÃO DE RESPOSTA:

Levonorgestrel.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Levonorgestrel em dose única.
- Levonorgestrel 1,5 mg via oral, dose única.
- Levonorgestrel (contracepção de emergência).
- Acetato de levonorgestrel.

69) PADRÃO DE RESPOSTA:

- Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir
- Tenofovir + Lamivudina associados a um inibidor de integrase (Dolutegravir).

➤ **Situação Problema – Questões de 70 a 72**

70) PADRÃO DE RESPOSTA:

Vertigem Posicional Paroxística Benigna.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- VPPB (Sigla amplamente aceita).
- Vertigem Postural Paroxística Benigna.
- VPPB do canal posterior.
- Canalitíase do canal posterior.
- Vertigem por canalitíase.
- Vertigem periférica posicional.
- Vertigem periférica benigna.

71) PADRÃO DE RESPOSTA:

Manobra de Epley.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Reposicionamento de Epley.
- Manobra de Reposicionamento para Canalitíase (Epley) .
- Manobra de Reposicionamento Canalicular (Epley).
- Manobra de reposição otolítica (Epley).
- Manobra de reposicionamento dos otólitos do canal posterior, com sequência de rotações cefálicas e corporais de 90° até sentar, para devolver os otólitos ao utrículo.
- Manobra de posicionamento para os otólitos.
- Manobra de Reposicionamento Canalicular (MRC) (Epley).
- Manobra de Reposicionamento Canalicular (MRC)para o canal posterior (Epley)

72) PADRÃO DE RESPOSTA:

Reabilitação vestibular com exercícios de habituação e equilíbrio.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Reabilitação vestibular
- Exercícios vestibulares de habituação/adaptação
- Programa de reabilitação vestibular para reduzir recorrência e risco de quedas
- Treino de equilíbrio associado a exercícios vestibulares
- Repetir a Manobra de Epley

➤ **Situação Problema – Questões de 73 a 75**

73) PADRÃO DE RESPOSTA:

Projeto Terapêutico Singular.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Plano Terapêutico Compartilhado.

74) PADRÃO DE RESPOSTA:

Vínculo

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- Vínculo terapêutico.
- Vínculo com a equipe.
- Vínculo longitudinal.
- Vínculo de confiança.

75) PADRÃO DE RESPOSTA:

CRAS / Centro de Referência de Assistência Social.

RESPOSTAS ACEITÁVEIS :

- CRAS do território.
- CRAS da área de abrangência.